

# 剑蛇属中国产种类的分类学研究

赵尔宓

(中国科学院成都生物研究所)

剑蛇属(*Sibynophis*)是分布于亚洲的一属中小型蛇类,其特征是:齿骨后端与隅骨(或称上隅骨)游离,二者间有一定程度的活动性;牙齿细小均匀而数多,每侧上颌骨上可有25~56枚,各牙齿侧扁而端部略平,在上颌骨上形成剑形的锐利切缘,适于咬吃具硬鳞的蜥蜴如石龙子之类;全部背椎均具发达的椎体下突(hypapophysis)。本属与分布于中南美的铲齿蛇属(*Scaphiodontophis*)很相近,过去曾将此二属共置于剑蛇属。

本属已知共7种,我国有3种。黑领剑蛇 *Sibynophis collaris* (Gray, 1853)分布于喜马拉雅山南坡,西起Simla,东到中南半岛,我国记载于西藏东南部及云南,它以上唇鳞10枚,前颞鳞一枚,仅与最大的第八枚上唇鳞相切,区别于另二种(图1)。黑头剑蛇 *Sibynophis chinensis* (Gunther, 1889)分布于我国南部广大地区及越南北部,上唇鳞9枚,前颞鳞2枚,下前颞鳞较大,与第七、八两枚上唇鳞相切。棕头剑蛇 *Sibynophis grahami* (Boulenger, 1904)系依据云南昆明与曲靖间一号标本所订名,以后曾在昆明与武定采到过标本。棕头剑蛇与黑头剑蛇很相近,所以Pope(1935, 81页)及Smith(1943, 3:276)仅以其具较少(83或以下)尾下鳞与黑头剑蛇(98或以上)相区别。

Maki(1931)依据我国台湾省剑蛇属标本10号,以其腹鳞数偏低(164-179)订为台湾亚种(*Sibynophis collaris formosensis*——按其上唇鳞及颞鳞特征应隶 *Sibynophis chinensis*)。经采用划分亚种的差异系数法将台湾标本与我国大陆各地黑头剑蛇标本进行比较,无论在腹鳞数、尾下鳞数或腹鳞与尾下鳞数之和等方面,二者均未达到划分亚种的标准。因此认为台湾标本作为黑头剑蛇的亚种是不能成立的。

近年,分别在位于四川与云南交界处的泸沽湖的云南一侧及四川西南部米易县采到一批剑蛇属标本,其尾下鳞数较多与黑头剑蛇似,但腹鳞数也较多又与棕头剑蛇似,由此引起作者的注意。于是,将我国各地被鉴定为此两种的标本加以比较,并参考文献记载,结果发现:黑头剑蛇与棕头剑蛇标本具以下共同特征:上唇鳞9, 3-3-3式;眶前鳞1,眶后鳞2;颞鳞2+2,仅个别标本一侧的前颞鳞为1;二者的腹鳞与尾下鳞在两性间无明显区别,虽然黑头剑蛇的尾下鳞多于棕头剑蛇,棕头剑蛇的腹鳞多于黑头剑蛇,但腹鳞与尾下鳞数之和则较一致;此外,二者的色斑亦相似。因此认为: *Sibynophis grahami* (Boulenger, 1904)应为 *Sibynophis chinensis* (Gunther, 1889)的同物异名,其中文名仍称黑头剑蛇。

在详细比较黑头剑蛇各地居群的腹鳞与尾下鳞数(表1及表2),结合地理分布特点(图2及图3)则可划分为三种类型。由图2可见:居群A以腹鳞数较少区别于居群B与C,其两两间的差异系数(Coefficient of Difference)均已达到划分亚种的标准;居群B以尾下鳞数少于居群C,彼此间的差异系数亦已达到划分亚种的标准。居群C以其腹鳞与尾下鳞数之和多于居群A,彼此间的差异系数也达到划分亚种的标准。因此认为:黑头剑蛇可划分为3个亚

Table 1. Ventral and Subcaudal Counts of *Sibynophis chinensis*.

Locality	n	Ventrals	Subcaudals	Ventrals+Subcaudals	Material or Reference
Yichang, Hubei	1	182	53+		Type of <i>S. chinensis</i>
Sichuan	16	172-184	83-119	258-295	Chengdu Inst. of Biol.
Gansu	2	179, 184	25+, 49+		Feng, 1981
Guizhou	3	171-186	104-114	285-294	Chengdu Inst. of Biol.
"	10	176-185	90-130	270-309	Wu et al., 1985
Guangxi	2	176, 178	50+, 112	288	Fan, 1931
Jiangxi	2	170, 175	74+, 81+		Chang, 1938
"	2	179, 180	108, 101	287, 281	Maslin, 1950
Fujian	6	174-180	107-125	287-299	Chengdu Inst. of Biol.
Hainan I.	1	173	81	254	Chengdu Inst. of Biol.
"	1	167	115	282	Schmidt, 1925
Taiwan	10	164-179	110-129	281-301	Maki, 1931
"	1	182	79+		Kuntz, 1963
Vietnam	1	165	107	272	Bourret, 1937
between Kunming and Kutsing	1	185	83	268	Type of <i>S. grahami</i>
Yunnan	2	188, 194			Pope, 1935
"	1	195	93	288	Chengdu Inst. of Biol.
Western Guizhou	11	186-208	80-104	267-309	Wu et al., 1985
Miyi, Sichuan	7	189-199	108-119	297-314	Chengdu Inst. of Biol.
Lugu, Lake Yunnan	3	196-199	112-115	310-312	Yunnan University

Table 2. Subspecific Differentiation of *Sibynophis chinensis*.

Population	n	Ventrals			Subcaudals			Ventrals+Subcaudals		
		range	mean	S. D.	range	mean	S. D.	range	mean	S. D.
A	58	164-187	177.4	5.09	81-130	108.8	10.93	254-309	285.9	10.78
B	15	185-208	193.3	6.32	80-110	95.8	8.32	267-309	289.5	12.67
C	10	189-199	194.8	3.73	108-119	113.5	3.51	297-314	309.1	5.82

Table 3. Description of *Sibynophis chinensis miyiensis*, ssp nov.

Number	Sex	Dorsal scales	Ventrals	Subcaudals	Upper labials	Lower labials	Loreals	Preoculars	Postoculars	Temporals
CIB 105026	male	17-17-17	189	108	3-3-3	9/8(4)	1	1	2	2+3
CIB 105027	"	17-17-17	194	110	3-3-3	9(4)	1	1	2	2+2 holotype
CIB 105028	"	17-17-17	192	119	3-3-3	9(4)	1	1	2	2+2
CIB 105030	"	17-17-17	198	116	3-3-3	9(4)	1	1	2	2+2
CIB 105031	"	17-17-17	199	115	3-3-3	8(4)	1	1	2	2+2
YU 857012	"	17-17-17	198	112	3-3-3	9(4)	1	1	2	2+2
YU 857013	"	17-17-17	199	113	3-3-3	10(5)	1	1	2	2+1
YU 857021	"	17-17-17	196	115	3-3-3	10(5)	1	1	2	2+2
CIB 105025	female	17-17-17	190	58+	3-3-3	9(4)	1	1	2	2+2 allotype
CIB 105029	"	17-17-17	193	99+	3-3-3	8(4)	1	1	2	2+2




Figure 1. Head scalation of Chinese species of the genus *Sibynophis*.  
 upper: *Sibynophis collaris*  
 lower: *Sibynophis chinensis*




Fig. 2. Coefficient of Difference among Three Populations of *Sibynophis chinensis*.




Figure 3. Distribution of subspecies of *Sibynophis chinensis*.  
*S. c. chinensis* (dotted line)  
*S. c. grahami* (black line)  
*S. c. miyiensis*, ssp. nov. (black spot)



种如下:

1. 黑头剑蛇指名亚种 *Sibynophis chinensis chinensis* (Günther, 1889)

*Ablabes chinensis* Günther, 1889. Ann. Mag. Nat. Hist., (6)4:220.

*Sibynophis hainanensis* Schmidt, 1925. Amer. Mus. Novitates, no. 157 (type locality: Nodoo, Hainan).

模式标本产地: 湖北宜昌。

形态特征: 腹鳞数较低(164-187, 平均177.4), 尾下鳞数较高(81-130, 平均108.8), 腹鳞与尾下鳞数之和254-309, 平均285.9。

分布: 国内已知产地有: 江苏(栖霞山), 浙江(桐庐)、莫干山), 湖北(宜昌), 湖南(长沙), 福建(崇安、南平、福州、福清、德化), 台湾, 江西(庐山), 广东(罗浮山、连平), 海南岛(那大、五指山), 广西(罗香), 贵州(印江、雷山、兴义、赤水、清镇、务川、贵定), 四川(九峰山、峨眉山、安县、宝兴、宜宾), 甘肃(徽县), 山西(石泉)。国外见于越南北部。

2. 黑头剑蛇云贵高原亚种 *Sibynophis chinensis grahami* (Boulenger, 1904)

*Polydontophis grahami* Boulenger, 1904. Ann. Mag. Nat. Hist., (7)13:132.

模式标本产地: 云南昆明曲靖间。

形态特征: 腹鳞数较高(185-208, 平均193.3), 尾下鳞数较低(80-110, 平均95.8), 腹鳞与尾下鳞数之和267-309, 平均289.5。

分布: 云南(昆明、武定), 贵州(威宁)。

3. 黑头剑蛇米易亚种 新亚种 *Sibynophis chinensis miyiensis* Zhao and Kou, ssp. nov.

模式标本:

正模: CIB105027, 雄性; 四川米易, 海拔880m; 1986年6月; 康绍和采。

配模: CIB105025, 雌性; 与正模同。

副模: 7号雄性(CIB Nos. 105026, 105028, 105030-1; YU Nos. 857012-3, 857021), 1号雌性(CIB105029)。其中 CIB 系列与正模同, YU 系列采自四川云南交界处的泸沽湖, 海拔2600m; 1985年; 寇治通采。

模式标本产地: 四川米易与四川云南交界处的泸沽湖。

形态特征: 腹鳞数(189-199, 平均194.8)与尾下鳞数(108-119, 平均113.5)均较高, 腹鳞与尾下鳞数之和(297-314, 平均309.1)亦较已知另二亚种为高。

分布: 目前仅见于模式标本产地。

综上所述, 剑蛇属在我国有二种, 其中黑头剑蛇有3个亚种, 检索如下:

- 1A 上唇鳞10, 3-3-4式; 前颞鳞1枚, 其下缘仅与最大的第八枚上唇鳞相切.....黑颌剑蛇 *S. collaris*
- 1B 上唇鳞9, 3-3-3式; 前颞鳞2枚, 其下缘楔入第七、八两枚上唇鳞间 .....2
- 2A 腹鳞187以下; 分布于我国东部低山丘陵地区.....黑头剑蛇指名亚种 *S. c. chinensis*
- 2B 腹鳞185以上; 分布于我国西部云贵高原及川西南山地.....3
- 3A 尾下鳞110以下; 分布于贵州西部及云南东部高原地区  
.....黑头剑蛇云贵高原亚种 *S. c. grahami*
- 3B 尾下鳞108以上; 分布于四川西南山地及云南北部山地  
.....黑头剑蛇米易亚种 *S. c. miyiensis*

## 参 考 文 献

- 伍律等: 贵州爬行类志. 贵州人民出版社, (1985).
- 冯孝义: 甘肃的蛇类. 两栖爬行动物研究, 5(5): 29-44(1981).
- Chang, M. L. Y. Snakes of Lushan (Kiangsi) collected by R. C. Ching. *Contrib. Biol. Lab. Sci. Soc. China*, 11(10):317-344(1936).
- Fan, T. H. Preliminary report of reptiles from Yaoshan, Kwangsi, China. *Bull. Dept. Biol. Col. Sci. Sun Yatsen Univ.*, No. 11(1931).
- Kuntz, R. E. Snakes of Taiwan. *US Naval Medical Research Unit*, No. 2(1963).
- Maki, M. A Monograph of the Snakes of Japan. Dai-Ichi Shobo, Tokyo (1931).
- Maslin, T. P. Snakes of the Kiukiang-Lushan area, Kiangsi, China. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, (4) 26(12):419-466(1950).
- Pope, C. H. The Reptiles of China. Vol. 10 of Nat. Hist. of Cent. Asia, Amer. Mus. Nat. Hist.(1935).
- Schmidt, K. P. New reptiles and a new salamander from China. *Amer. Mus. Novitates*, No. 157(1925).
- Smith, M. A. Serpentes, vol. 3 of Rept. and Amphib., The Fauna of British India, Ceylon and Burma. London: Taylor & Francis, Ltd.(1943).

## A TOXONOMIC STUDY ON CHINESE SPECIES OF THE GENUS *SIBYNOPHIS*

Zhao Ermi

(Chengdu Institute of Biology, Academic Sinica)

### Abstract

Three species of *Sibynophis* were recognized from China. *S. collaris* is readily distinguished from the other two in having ten supralabials with the eighth, which is largest, in contact with the single anterior temporal. *S. grahami* should be a synonym of *S. chinensis*. *S. chinensis* can be divided into three subspecies. The nominate subspecies has less ventrals and more subcaudals; *S. c. grahami*, in contrast with the former, has more ventrals but less subcaudals. The total number of ventrals plus subcaudals is the same in these two subspecies. The third one is a new subspecies named as *S. c. miyiensis*. It has a higher ventral count like the *grahami* and a higher ventrals plus subcaudals count than the former two subspecies. *Sibynophis chinensis miyiensis* Zhao and Kou, ssp. nov.

TYPES: Holotype: CIB 105027, male, Miyi County, Sichuan Province, China, 880m, 1986; by Kang Shaohe. Allotype: CIB 105025, female, the same as the holotype. Paratypes: 7 males (CIB Nos. 105026, 105028, 105030-1; YU Nos. 857012-3, 857021) and 1 female (CIB 105029). The CIB number series the same as the holotype. The YU number series collected from Lugu Lake, Sichuan-Yunnan border, 2600m; 1985; by Kou Zhitong.

DIAGNOSIS: This new subspecies differs from the other two subspecies in

having higher ventrals plus subcaudals count. It differs from *S. c. chinensis* in having more ventrals and from *S. c. grahami* in having more subcaudals.

DISTRIBUTION: Known from the type locality: Miyi County, southwestern Sichuan and on the shore of Lugu Lake, which constitutes part of the border between Sichuan and Yunnan.

---

This article was read by the author at the annual meetings of ASIH held at Albany 21-25 June, 1987.